

**Tabelle 2.** Vergleiche des Holzhauser Waldes mit anderen Gebieten im Saarland bezüglich der Bewertungs-relevanten Parameter

Datei: Tabelle 2 GebietsvergleicheNeu

Gebiet, Teilgebiet, Biotop	Kürzel JAS	Exku Anzahl	Größe ha	GAZ	RLA Anzahl	RLA %	GM	GI	GW	GM <sub>R</sub>	GI <sub>R</sub>	GW <sub>R</sub>
Holzhauser Wald, Hainsimsen-Buchenwald (unten)	a	4	1,5	142	13	9,15	2,15	1,14	0,53	1,16	1,26	1,43
Holzhauser Wald, Hainsimsen-Buchenwald (oben)	b	4	2,0	122	8	6,56	2,88	0,94	0,33	0,87	1,04	0,88
Holzhauser Wald, Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (unten)	c	4	1,5	179	21	11,73	2,38	1,19	0,50	1,05	1,32	1,34
Holzhauser Wald, Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (oben)	d	4	1,5	151	9	5,96	1,44	0,70	0,49	1,73	0,78	1,31
Holzhauser Wald, Eichenmischwald + Edellaubholz (oben)	e	4	2,0	130	11	8,46	2,64	1,14	0,43	0,95	1,27	1,17
Holzhauser Wald, Fichten-Forst	f	4	1,5	98	12	11,76	1,50	2,06	1,37	1,67	2,29	3,70
Holzhauser Wald, Torfmoos-Moorbirken-Wald (Fragment)	g	4	0,1	98	21	21,43	2,19	3,76	1,71	1,14	4,17	4,62
Holzhauser Wald, Torfmoos-Moorbirken-Erlen-Fichten-Wald	h	4	0,6	145	34	23,45	2,15	2,87	1,34	1,17	3,18	3,60
Holzhauser Wald, Erlen-Bruchwald+Bachbegleitender Erlenwald	i	4	0,6	121	15	12,40	2,07	1,79	0,87	1,21	1,98	2,33
Holzhauser Wald, Bachbegl. Erlenwald/Torfmoos-Moorbirkenw.	j	3	0,2	62	10							
Holzhauser Wald, Natürliche Silikat-Felswand (Kappfels)	k	4	0,5	83	7							
Holzhauser Wald, Pfeifengraswiese	l	4	0,4	25	4							
Holzhauser Wald, Magerwiese	m	4	0,12	8	1							
Holzhauser Wald, Summe der 13 Probeflächen von 2008 (a-m)	p	52	12,52	485	100	20,62	2,176	0,92	0,43	1,16	1,03	1,15
Holzhauser Wald, (1990-2008a)	o	70	500	448	91	20,31	2,26	0,97	0,43	1,11	1,07	1,15
Holzhauser Wald, (1990-2008a+2008) (a-m)= p + o	q	122	500	627	155	24,72	2,18	0,92	0,42	1,13	1,02	1,15
Holzhauser Wald, Kappwald, Kappbachaue+ Umg. (1950 – 1989)	n	100	150	575	203	35,30	2,14	1,40	0,66	1,17	1,55	1,76
Holzhauser Wald, gesamt (1950 – 2008)	r	222	500	833	297	35,65	2,06	1,11	0,54	1,21	1,23	1,45
St. Johanner Stadtwald, Saarbrücken (1950 – 1989)	7	843	300	720	146	20,78	2,25	0,69	0,31	1,11	0,77	0,83
Fechinger Wald, Sbr.-Fechingen (1950-1989)	8	371	250	836	286	34,21	2,19	1,06	0,48	1,14	1,18	1,30
Oberthaler Bruch (NSG) + Umgeb. (1950 – 1989)	84	50	150	398	88	22,11	2,28	1,15	0,50	1,10	1,28	1,36
Kalmenwald, Gonesweiler (1950 – 1989)	172	25	250	347	74	21,33	2,54	1,24	0,49	0,98	1,37	1,31
Bettelwald, Ormesheim (1950 – 1989)	21	127	150	382	68	17,80	2,46	0,95	0,39	1,02	1,06	1,05
Kreuzberg, Völklingen (1950 – 1989)	13	3843	600	1243	596	47,95	1,80	1,18	0,66	1,39	1,31	1,77
Steinkohlen-Bergehalde Sbr.-Jägersfreude, (1960 – 1989)	237	96	50	330	48	14,55	2,35	0,88	0,37	1,02	0,69	0,69
Warndtweiher + Umgebung (1950 – 1989)	52	178	150	732	176	24,04	2,49	0,81	0,32	1,00	0,90	0,88
Rabenhorst, Homburg (1950 – 1989)	11	200	250	556	151	27,16	2,25	1,10	0,49	1,11	1,22	1,32
Höllscheider Tal+Obertal, Niederwürzbach (1960 – 1989)	32	66	100	365	50	13,70	2,44	0,76	0,31	1,03	0,84	0,84
Jägersburger Moor (NSG) + Umgeb., Jägersburg (1960 – 1989)	125	26	150	323	49	15,17	2,67	0,93	0,35	0,94	1,03	0,94
Saarland gesamt (Flächen- und Zeit-integral)			250000	3100	1717	57,32	1,45	0,9737	0,6722	1,727	1,0801	1,810
Saarland, Mittelwerte über alle besser untersuchten Gebiete							2,5000	0,9015	0,3714	1,000	1,0000	1,000